

# Roséole, Exanthème subit, HHV 6 ou 7

Mise à jour  
15/11/2024

Autres dénominations  
Exanthème Subit  
Herpèsvirus HHV 6 Ou 7  
Sixième Maladie

## Épidémiologie

### Agent infectieux

HHV-6 et HHV-7

- Plus de 95% des adultes sont séropositifs pour HHV-6
- Environ 50% des enfants ont été infectés à l'âge de 1 an et 80% à l'âge de 2 ans (pic entre 9 et 21 mois)

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission

- Transmission interhumaine respiratoire par gouttelettes
- Par contact avec la salive (possiblement également de sujets asymptomatiques)



Par voie transplacentaire



Lors de greffe d'organe

---

## Période d'incubation

Entre 5 et 15 jours (moyenne 9 jours)

---

## Durée d'infectiosité

Pendant la durée de la maladie

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Éviction du cas

Aucune mesure d'éviction spécifique n'est préconisée dans cette situation.

---

## Prise en charge des personnes contacts

### Éviction des contacts

Pas d'éviction pour les contacts.

---

## Déclaration du cas

## Déclaration au médecin cantonal

Non

---