

# Conjonctivite

## Epidémiologie

### Agent infectieux

-  **Bactérienne** : Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, et Moraxella catarrhalis
  -  **Virale** : adénovirus, enterovirus
- 

### Réservoir

Homme

---

### Mode de transmission

-  Par contact direct avec les sécrétions oculaires ou respiratoires de personnes infectées
  -  Par contact indirect avec des objets contaminés (mains)
-

## Période d'incubation

Variable selon l'agent infectieux

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Éviction du cas positif/suspect

-  Aucune mesure d'éviction spécifique n'est normalement préconisée.

**En cas de flambée de cas (suspicion de conjonctivites épidémiques), à partir du 3ème cas :**

-  éviction des cas confirmés des cercle préscolaire (crèche, garderie, jardin d'enfant, maman de jour), scolaire (tout degré) et para-scolaire/associatif (camp, piscine, gymnastique, structure d'accueil pour l'enfant en milieu scolaire) à considérer pour limiter la propagation du virus.
- 

## Prise en charge des personnes contacts

### Éviction des contacts

Pas d'éviction pour les contacts

---

## Déclaration du cas

### Déclaration au médecin cantonal

Non

---