

Bronchiolite et autres infections respiratoires virales chez le nourrisson et le jeune enfant

Mise à jour
07/11/2024

Autres dénominations
Virus Syncytial Respiratoire
RSV
Adénovirus
Bocavirus
Coronavirus Saisonnier
Human Metapneumovirus
Parainfluenza
Rhinovirus

Epidémiologie

Agent infectieux

Virus respiratoire syncytial (RSV), Adénovirus, Bocavirus, Coronavirus (non SARS, non MERS), Human Metapneumovirus, Parainfluenza, Rhinovirus

Réservoir

Homme

Mode de transmission

-  par contact direct entre patients et/ou par gouttelettes selon l'agent viral
 -  par l'intermédiaire du personnel (mains)
 -  par contact indirect (matériel de soins ou d'examens, instruments, environnement immédiat)
-

Période d'incubation

-  1 à 10 jours, variable selon l'agent viral
-

Durée d'infectiosité

-  24h avant et pendant toute la durée des symptômes (excrétion du virus prolongée chez le nourrisson ou le patient immunocompromis)
-

Prise en charge du cas positif/suspect

Éviction du cas

Aucune mesure d'éviction spécifique n'est préconisée dans cette situation.

Prise en charge des personnes contacts

Définition d'une personne contact

Contact proche sans masque lorsque le cas index est symptomatique.

Éviction des contacts

Pas d'éviction pour les contacts.

Prophylaxie vaccination

- Prophylaxie par oseltamivir dès que possible (dans les 48 heures maximum) pour les contacts d'un cas de grippe confirmée avec un des facteurs de risque ci-dessous et non-vaccinés ou dans les 2 semaines suivant leur vaccinations

Facteurs de risque:

- Cardiopathie chronique avec répercussion sur la circulation pulmonaire
- Pneumopathie chronique avec état inflammatoire permanent ou susceptible de décompensation sur virose
- Insuffisance rénale chronique
- Maladie métabolique chronique avec répercussion sur fonction cardiaque, pulmonaire ou rénale
- Obésité morbide (IMC ≥ 40)
- Hépatopathie chronique
- Maladie neurologique ou neuromusculaire avec répercussion sur la fonction cardiaque ou pulmonaire
- Asplénie, status-post splénectomie
- Déficiência immunitaire
- Pensionnaires d'établissements de soins pour maladies chroniques
- Prématurés : < 33 SG ou PN < 1500 g (durant les 2 saisons hivernales suivant la naissance)



Grossesse (2ème et 3ème trimestre)



Post-partum (en l'absence de vaccination durant la grossesse) dans un délai de 1 mois



≥ 65 ans

Déclaration du cas

Déclaration au Médecin cantonal

Non
