

# Cytomegalovirus

Mise à jour  
08/11/2024

Autres dénominations  
CMV

## Epidémiologie

## Agent infectieux

Cytomégalovirus

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission

-  par contact direct avec les muqueuses et liquides biologiques (sang, urine, salive, sécrétions respiratoires et génitales, lait maternel, larmes, prélèvements tissulaires etc.), par transfusion sanguine ou par transplantation d'organe
  -  verticale par voie transplacentaire, lors de l'accouchement, lors de l'allaitement
-

## Période d'incubation

Variable selon le mode de transmission et le type de manifestations, mais entre 3 semaines et 3 mois.

---

## Durée d'infectiosité

Après une infection primaire, le virus peut être isolé dans la salive et les urines pendant des mois, puis réapparaître tout au long de la vie lors de réactivations asymptomatiques.

Les enfants qui ont été infectés pendant la période néonatale peuvent excréter le virus pendant 5 à 6 ans.

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Éviction du cas positif/suspect

Aucune mesure d'éviction spécifique n'est préconisée dans cette situation.

---

## Prise en charge des personnes contacts

### Éviction des contacts

Pas d'éviction pour les contacts.

---

## Autre contact

Le respect des précautions standard d'hygiène s'impose, en particulier pour les femmes enceintes séronégatives en contact avec les sécrétions corporelles d'enfants en bas âge (risque d'infection à CMV congénitale).

---

## Déclaration du cas

## Déclaration au médecin cantonal

Non

---