

Hépatite B

Mise à jour

12/11/2024

Epidémiologie

Agent infectieux

Virus de l'Hépatite B (virus ADN)

Réservoir

Homme

Mode de transmission

Transmission interhumaine par le sang ou autre liquide biologique, contact étroits familiaux (enfants), transmission verticale de la mère à l'enfant

Période d'incubation



Moyenne: 60-90 jours



Maximum: 180 jours

Durée d'infectiosité

Potentiel de contagion de durée indéfinissable (aussi longtemps que l'antigène HBs est détectable dans le sang)

Prise en charge du cas positif/suspect

Eviction du cas

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation. L'état clinique est seul responsable d'une éventuelle absence.

Prise en charge des personnes contacts

Prophylaxie Vaccination

La prophylaxie post-expositionnelle est indiquée après des relations sexuelles avec des partenaires présentant une hépatite B aiguë ou après une blessure avec une seringue. Les HBIG sont efficaces si elles sont administrées rapidement. Au-delà d'une semaine après l'exposition, cette mesure est probablement inutile. Il est possible que l'association avec une vaccination améliore l'efficacité du traitement. Une sérologie de la personne exposée (anti-HBs) est recommandée si elle peut être obtenue rapidement.

Les personnes vivant dans le même ménage qu'un sujet présentant une hépatite B aiguë devraient également être vaccinées. L'administration complémentaire d'immunoglobulines n'est considérée que pour les enfants de moins de 12 mois non vaccinés dont la personne qui en prend soin le plus étroitement présente une infection aiguë.
