

Rubéole

Mise à jour
15/11/2024

Epidémiologie

Agent infectieux

Virus de la rubéole (famille des Togavirus)

Réservoir

Homme

Mode de transmission



Transmission interhumaine respiratoire par gouttelettes



Par contact direct avec les sécrétions respiratoires ou urine d'une personne infectée ou par contact indirect (environnement immédiat contaminés, mains)



Transmission transplacentaire (rubéole congénitale)

Période d'incubation

14 à 17 jours, avec des extrêmes allant de 14 à 21 jours

Durée d'infectiosité

Une semaine avant et jusqu'à 7 jours après le début de l'exanthème.

Les enfants qui ont contracté le virus in-utero peuvent excréter le virus pendant des mois après la naissance

Prise en charge du cas positif/suspect

Éviction du cas

Aucune mesure d'éviction scolaire spécifique, mais il est recommandé d'éviter les contacts avec les femmes enceintes

Prise en charge des personnes contacts

Éviction des contacts

Pas d'éviction pour les contacts.

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal



Déclaration du médecin dans les 24 heures uniquement pour les rubéoles congénitales.

Pour plus d'information, consultez :



[OFSP - Déclaration des maladies transmissibles](#)
