

Attitude recommandée en présence de ...

Coxsackie (virus)

Syndrome Pied-main- bouche

Autres appellations ou pathologies analogues

Dénomination	Herpangine, Syndrome pied-main-bouche
Denomination	rie pangne, synarome pied mam sodene

Mesures concernant la personne infectée (cas source)

Aucune mesure préventive	l'état clinique est seul responsable d'une éventuelle absence.
spécifique n'est préconisée dans	
cette situation	

Mesures concernant les personnes exposées

	•
Aucune mesure préventive	ni aucune précaution particulière.
spécifique n'est préconisée dans	
cette situation	

Mesures concernant les locaux

Aucune mesure préventive	ni aucune précaution particulière.
spécifique n'est préconisée dans	
cette situation	

Caractéristiques épidémiologiques

Mode de transmission de	Transmission interhumaine respiratoire par gouttelettes ou faeco-orale
l'infection	
Durée de la période	Moyenne: 3-5 jours
d'incubation avant le début de	
la maladie	
Durée de la contagion ou de	Moyenne: 7 jours
l'excrétion du germe après le	Maximum: 14 jours
début de la maladie	
Durée de l'intervalle secondaire	Moyenne: 7 jours
	Maximum: 15 jours

Déclaration obligatoire des maladies transmissibles

Maladie à déclaration	Non
obligatoire (et adresses des	
médecins cantonaux)	