

Attitude recommandée en présence de ...

Mycoplasma pneumoniae

Autres appellations ou pathologies analogues

Dénomination	Bronchite à Mycoplasme, Laryngite à Mycoplasme, Pneumonie à Mycoplasme, Trachéite à Mycoplasme
--------------	--

Mesures concernant la personne infectée (cas source)

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...l'état clinique est seul responsable d'une éventuelle absence.
--	---

Mesures concernant les personnes exposées

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...ni aucune précaution particulière.
--	---------------------------------------

Mesures concernant les locaux

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...ni aucune précaution particulière.
--	---------------------------------------

Caractéristiques épidémiologiques

Mode de transmission de l'infection	Transmission interhumaine respiratoire par gouttelettes
Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie	Moyenne: 14-21 jours Maximum: 32 jours
Durée de la contagion ou de l'excrétion du germe après le début de la maladie	Patient sans antibiothérapie: ≤20 jours

Déclaration obligatoire des maladies transmissibles

Maladie à déclaration obligatoire (et adresses des médecins cantonaux)	Non
--	-----