

Attitude recommandée en présence de ...

Oreillons (virus)

Autres appellations ou pathologies analogues

Dénomination	Oreillons, Parotidite ourlienne, Sous-maxillite ourlienne
--------------	---

Mesures concernant la personne infectée (cas source)

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...l'état clinique est seul responsable d'une éventuelle absence.
--	---

Mesures concernant les personnes exposées

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...ni aucune précaution particulière.
--	---------------------------------------

Mesures concernant les locaux

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...ni aucune précaution particulière.
--	---------------------------------------

Caractéristiques épidémiologiques

Mode de transmission de l'infection	Transmission interhumaine respiratoire par gouttelettes
Définition du contagé familial	Vie sous le même toit que le cas source
Définition du contagé institutionnel ou professionnel	Séjour ≥ 5 heures dans le même local et en même temps que cas source
Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie	Moyenne: 16-18 jours Maximum: 28 jours
Durée de la contagion ou de l'excrétion du germe avant le début de la maladie	Moyenne: 2 jours Maximum: 7 jours
Durée de la contagion ou de l'excrétion du germe après le début de la maladie	Moyenne: 5 jours Maximum: 9 jours
Durée de l'intervalle secondaire	Moyenne: 12-15 jours
Nombre reproducteur de base	12
Valeur prédictive positive du diagnostic clinique	0.1 en situation d'incidence sporadique
Valeur prédictive négative d'un test diagnostique négatif	IgM spécifique: 0.2-0.45

Attitude recommandée en présence de ...

Déclaration obligatoire des maladies transmissibles

Maladie à déclaration obligatoire (et adresses des médecins cantonaux)	Non
--	-----