

## Attitude recommandée en présence de ...

### Parvovirus B 19

#### Autres appellations ou pathologies analogues

Dénomination	Cinquième maladie, Erythème infectieux, Mégalérythème épidémique
--------------	--

#### Mesures concernant la personne infectée (cas source)

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...l'état clinique est seul responsable d'une éventuelle absence.
--	---

#### Mesures concernant les personnes exposées

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...ni aucune précaution particulière.
--	---------------------------------------

#### Mesures concernant les locaux

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...ni aucune précaution particulière.
--	---------------------------------------

#### Caractéristiques épidémiologiques

Mode de transmission de l'infection	Transmission interhumaine respiratoire par gouttelettes
Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie	Minimum 4 jours Moyenne 13-20 jours
Durée de la contagion ou de l'excrétion du germe avant le début de la maladie	Moyenne: 3 jours Maximum: 6 jours
Durée de la contagion ou de l'excrétion du germe après le début de la maladie	Aucun potentiel de contagion après le début de la maladie
Durée de l'intervalle secondaire	Moyenne: 7 jours Maximum: 11 jours
Taux d'attaque de la maladie	Toutes circonstances confondues: 10 à 30%

#### Déclaration obligatoire des maladies transmissibles

Maladie à déclaration obligatoire (et adresses des médecins cantonaux)	Non
--	-----