

Attitude recommandée en présence de ...

Entamoeba histolytica : infection diarrhéique

Mesures applicables uniquement en présence de diarrhée

Autres appellations ou pathologies analogues

Dénomination	Amibiase, Colite amibienne, Entérite amibienne, Gastro-entérite amibienne
--------------	---

Mesures concernant la personne infectée (cas source)

Mesure N°1	<p>Eviction</p> <p>Situations justifiant l'application de la mesure: Eviction d'un enfant: nécessaire si la capacité de l'établissement à maintenir les mesures d'hygiène est dépassée Eviction d'un adulte: souhaitable si la personne est amenée à dispenser des soins à des nourrissons de moins de 6 mois</p> <p>Groupes à qui la mesure est applicable: Cercle préscolaire: crèche, garderie, jardin d'enfant, maman de jour Cercle parascolaire et associatif: camp</p> <p>Personnes à qui la mesure est applicable: Tout enfant fréquentant le groupe et tout adulte professionnellement actif dans le groupe</p> <p>Levée de la mesure: Dès 48 heures suivant l'arrêt de la diarrhée aiguë</p>
------------	---

Mesures concernant les personnes exposées

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...ni aucune précaution particulière.
--	---------------------------------------

Mesures concernant les locaux

Mesure N°1	<p>Contrôle de l'application stricte des mesures standard d'hygiène, en particulier lavage des mains</p> <p>Groupes à qui la mesure est applicable: Cercle préscolaire: crèche, garderie, jardin d'enfant, maman de jour Cercle parascolaire et associatif: camp</p>
Mesure N°2	<p>Port de gants jetables par le personnel lors du change d'un enfant symptomatique</p> <p>Groupes à qui la mesure est applicable:</p>

Attitude recommandée en présence de ...

Mesure N°3	<p>Cercle préscolaire: crèche, garderie, jardin d'enfant, maman de jour</p> <p>Renforcement des mesures de nettoyage et désinfection des locaux, objets et jouets</p> <p>Situations justifiant l'application de la mesure: Situation de flambée telle que définie dans la rubrique <i>Caractéristiques épidémiologiques</i></p> <p>Groupes à qui la mesure est applicable: Cercle préscolaire: crèche, garderie, jardin d'enfant, maman de jour Cercle parascolaire et associatif: camp</p> <p>Détails de la mesure: Lien</p>
------------	---

Caractéristiques épidémiologiques

Mode de transmission de l'infection	Transmission interhumaine faeco-orale (rarement par eau/aliment contaminé)
Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie	Durée variable selon charge infectieuse: Moyenne: 7-28 jours Maximum: plusieurs mois
Durée de la contagion ou de l'excrétion du germe avant le début de la maladie	Potentiel de contagion présent avant le début de la maladie mais de durée indéfinissable
Durée de la contagion ou de l'excrétion du germe après le début de la maladie	Potentiel de contagion présent après le début de la maladie mais de durée indéfinissable en l'absence de traitement spécifique
Définition d'une flambée ou épidémie	≥3 cas en ≤1 semaine

Déclaration obligatoire des maladies transmissibles

Maladie à déclaration obligatoire (et adresses des médecins cantonaux)	Non
--	-----