

Attitude recommandée en présence de ...

Herpès simplex (virus): infection oro-labiale aiguë

Autres appellations ou pathologies analogues

Dénomination	Stomatite herpétique aiguë
--------------	----------------------------

Mesures concernant la personne infectée (cas source)

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...l'état clinique est seul responsable d'une éventuelle absence.
--	---

Mesures concernant les personnes exposées

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...ni aucune précaution particulière.
--	---------------------------------------

Mesures concernant les locaux

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...ni aucune précaution particulière.
--	---------------------------------------

Caractéristiques épidémiologiques

Mode de transmission de l'infection	Transmission interhumaine respiratoire par gouttelettes
Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie	Moyenne: 4 jours Maximum: 6 jours
Durée de la contagion ou de l'excrétion du germe après le début de la maladie	Moyenne: 3 semaines Maximum: 8 semaines
Durée de l'intervalle secondaire	Moyenne: 6 jours Maximum: 12 jours

Déclaration obligatoire des maladies transmissibles

Maladie à déclaration obligatoire (et adresses des médecins cantonaux)	Non
--	-----