

Attitude recommandée en présence de ...

Salmonella autre que S. typhi et S. paratyphi: infection sans diarrhée

Autres appellations ou pathologies analogues

Dénomination	Bactériémie (sans diarrhée) à Salmonelle autre que S. typhi et S. paratyphi, Infection invasive (sans diarrhée) à Salmonelle autre que S. typhi et S. paratyphi, Méningite (sans diarrhée) à Salmonelle autre que S. typhi et S. paratyphi, Salmonellose autre que typhoïde et paratyphoïde sans diarrhée
--------------	---

Mesures concernant la personne infectée (cas source)

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...l'état clinique est seul responsable d'une éventuelle absence.
--	---

Mesures concernant les personnes exposées

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...ni aucune précaution particulière.
--	---------------------------------------

Mesures concernant les locaux

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...ni aucune précaution particulière.
--	---------------------------------------

Caractéristiques épidémiologiques

Mode de transmission de l'infection	Transmission interhumaine faeco-orale ou par eau/aliment contaminé
Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie	Durée variable selon charge infectieuse et espèce de salmonelle: Moyenne: 16 heures Maximum: 5 jours
Durée de la contagion ou de l'excrétion du germe après le début de la maladie	Patient <5 ans: Moyenne: 10 semaines Maximum: 6-12 mois Patient ≥5 ans: Moyenne: 4 semaines Maximum: 12 semaines
Définition d'une flambée ou épidémie	≥3 cas en ≤1 semaine

Déclaration obligatoire des maladies transmissibles

Maladie à déclaration obligatoire (et adresses des médecins cantonaux)	Cas isolé Non
--	----------------------

Attitude recommandée en présence de ...

	Flambée Oui, dans un délai de 24 heures Lien
Modalités pratiques de la déclaration	Rubrique <i>Flambée de cas</i> Lien