

Attitude recommandée en présence de ...

Salmonella paratyphi : infection diarrhéique

Autres appellations ou pathologies analogues

Dénomination	Fièvre paratyphoïde avec diarrhée
--------------	-----------------------------------

Mesures concernant la personne infectée (cas source)

Mesure N°1	<p>Eviction</p> <p>Situations justifiant l'application de la mesure: Eviction d'un enfant: nécessaire si la capacité de l'établissement à maintenir les mesures d'hygiène est dépassée</p> <p>Eviction d'un adulte: souhaitable si la personne est amenée à dispenser des soins à des nourrissons de moins de 6 mois</p> <p>Groupes à qui la mesure est applicable: Cercle préscolaire: crèche, garderie, jardin d'enfant, maman de jour Cercle parascolaire et associatif: camp</p> <p>Personnes à qui la mesure est applicable: Tout enfant fréquentant le groupe et tout adulte professionnellement actif dans le groupe</p> <p>Levée de la mesure: Dès 48 heures suivant l'arrêt de la diarrhée aiguë</p>
------------	--

Mesures concernant les personnes exposées

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...ni aucune précaution particulière.
--	---------------------------------------

Mesures concernant les locaux

Mesure N°1	<p>Contrôle de l'application stricte des mesures standard d'hygiène, en particulier lavage des mains</p> <p>Groupes à qui la mesure est applicable: Cercle préscolaire: crèche, garderie, jardin d'enfant, maman de jour Cercle parascolaire et associatif: camp</p>
Mesure N°2	<p>Port de gants jetables par le personnel lors du change d'un enfant symptomatique</p> <p>Groupes à qui la mesure est applicable:</p>

Attitude recommandée en présence de ...

Mesure N°3	<p>Cercle préscolaire: crèche, garderie, jardin d'enfant, maman de jour</p> <p>Renforcement des mesures de nettoyage et désinfection des locaux, objets et jouets</p> <p>Situations justifiant l'application de la mesure: Situation de flambée telle que définie dans la rubrique <i>Caractéristiques épidémiologiques</i></p> <p>Groupes à qui la mesure est applicable: Cercle préscolaire: crèche, garderie, jardin d'enfant, maman de jour Cercle parascolaire et associatif: camp</p> <p>Détails de la mesure: Lien</p>
------------	---

Caractéristiques épidémiologiques

Mode de transmission de l'infection	Transmission interhumaine faeco-orale ou par eau/aliment contaminé
Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie	Durée variable selon charge infectieuse: Moyenne: 14 jours
Durée de la contagion ou de l'excrétion du germe après le début de la maladie	Probabilité d'excrétion durant 1- 2 semaines: 90% Probabilité d'excrétion plus longue: ~10% Probabilité de portage permanent: <5%.
Définition d'une flambée ou épidémie	≥3 cas en ≤1 semaine

Déclaration obligatoire des maladies transmissibles

Maladie à déclaration obligatoire (et adresses des médecins cantonaux)	Oui, dans un délai de 24 heures Lien
Modalités pratiques de la déclaration	Rubrique <i>Maladies A-Z</i> Lien