

Attitude recommandée en présence de ...

Salmonella typhi: infection sans diarrhée

Autres appellations ou pathologies analogues

Dénomination	Fièvre typhoïde sans diarrhée
--------------	-------------------------------

Mesures concernant la personne infectée (cas source)

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...l'état clinique est seul responsable d'une éventuelle absence.
--	---

Mesures concernant les personnes exposées

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...ni aucune précaution particulière.
--	---------------------------------------

Mesures concernant les locaux

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...ni aucune précaution particulière.
--	---------------------------------------

Caractéristiques épidémiologiques

Mode de transmission de l'infection	Transmission interhumaine faeco-orale ou par eau/aliment contaminé
Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie	Durée variable selon charge infectieuse: Moyenne: 15-20 jours Maximum: >2 mois
Durée de la contagion ou de l'excrétion du germe après le début de la maladie	Probabilité d'excrétion durant 2 semaines: 90% Probabilité d'excrétion plus longue: ~10% Probabilité de portage permanent: <5%.
Définition d'une flambée ou épidémie	≥3 cas en ≤1 semaine

Déclaration obligatoire des maladies transmissibles

Maladie à déclaration obligatoire (et adresses des médecins cantonaux)	Oui, dans un délai de 24 heures Lien
Modalités pratiques de la déclaration	Rubrique <i>Maladies A-Z</i> Lien